Info prairie Lozère

11 AVRIL 2023

Cumul des températures *(cumul à partir du 1er février - base 0°C - 18°C - Source : Météo France)*

SITUATION AU 9 AVRIL 2023				
STATION		ALTITUDE	BASE 1er FEVRIER 2023	BASE 1er FEVRIER 2022
Basse altitude (<800m)	**Le Collet de Dèze**	485m	**588°C**	**/**
	Saint Etienne Vallée Française	518m	**638°C**	**587°C**
	Florac	590m	**481°C**	**462°C**
	Villefort	620m	**505°C**	**471°C**
	Mende ville	710m	**414°C**	**400°C**
	Montrodat	763m	**407°C**	**386°C**
	St Germain du Teil	775m	**432°C**	**406°C**
Demi-Montagne (800m – 950m)	**Rousses**	812m	**431°C**	**386°C**
	Le Pont de Montvert	875m	**437°C**	**391°C**
	Altier	900m	**422°C**	**382°C**
	La Salle Prunet	903m	**398°C**	**363°C**
	St Pierre des Tripiers	929m	**386°C**	**350°C**
	Mende Chabrits	935m	**394°C**	**361°C**
	Rimeize	939m	**359°C**	**312°C**
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	**Gatuzières**	965m	**381°C**	**340°C**
	Sauveterre	1018m	**350°C**	**/**
	Aumont Aubrac	1018m	**282°C**	**251°C**
	Bassurels	1042m	**349°C**	**299°C**
	Le Buisson	1088m	**259°C**	**228°C**
	Le Fau de Peyre	1163m	**289°C**	**/**
	Paulhac en Margeride	1175m	**267°C**	**238°C**
	Le Bleymard – bourg	1199m	**310°C**	**254°C**
Montagne (>1200m)	**La Panouse**	1260m	**241°C**	**201°C**
	Le Bleymard	1418m	**229°C**	**167°C**

Suivant les différentes zones, les sommes de T° sont en avance de 20 à 60 degrés cette année par rapport à 2022 : ce qui correspond environ à une semaine d'avance de la végétation.

Conseil de la semaine : Finalisation des apports de fertilisation sur les prairies d'altitude.

En Cévennes, la fin du déprimage approche ! Pour les parcelles destinées à la fauche par la suite, il est temps de débrayer le pâturage : les 500°C sont atteints ! Pour les plus tardifs, il ne faut pas attendre d'avoir trop d'herbe pour sortir les animaux au risque de se faire déborder.

Pour les zones de Demi-Montagne, les mises à l'herbe peuvent s'effectuer sur les parcelles les plus précoces ! Attention à la portance des sols.

Pour les plateaux d'altitude et en montagne, les derniers apports d'azote doivent se conclure pour les prairies!
Attention : les apports d'effluents et les passages de herse sur prairie doivent être terminés !

<u>Pour optimiser l'utilisation de la herse de prairie :</u>

- **Eviter un passage sur les prairies semées récemment**
- **Herser dans une fenêtre climatique adaptée en évitant un gel les 2/3 jours suivants, attention à la portance des sols**
- **Sur une prairie dégradée (campagnols, mousse…) ne pas avoir peur de faire 2 passages de herse !**
- **Après un pâturage, passage de herse pour étaler les bouses et aérer la prairie !**

L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :

Délai de 45 jours minimum

Retrouver tous les Infos Prairies sur le site de la Chambre d'Agriculture de la Lozère *https://lozere.chambre-agriculture.fr/*
Pour plus d'informations vous pouvez contacter Gabin Sezille : 04.66.65.62.00